

## ACERO OPPIO

*Acer campestre* L. – Fam. Aceraceae

Inglese: Hedge Maple – Tedesco: Feld Ahorn



Foto di Saverio Bonani



**CARATTERI DISTINTIVI** - Albero deciduo di media grandezza alto fino a 12-15 metri, a lento accrescimento, con tronco talvolta contorto, molto ramificato, a chioma ampia e rotondeggiante e corteccia grigio-bruna screpolata a placche; le foglie sono semplici, palmate a 5 lobi di colore verde scuro sopra e di consistenza leggermente coriacea; quest'ultime in autunno sono colorate dal giallo al rosso e spiccano cromaticamente sulle altre piante del bosco; la fioritura avviene in aprile-maggio; i frutti sono samare con ali aperte orizzontali, spesso rossicce.

**AREALE E HABITAT** - Specie presente in gran parte dell'Europa e dell'Asia occidentale, mentre in Italia è sporadico e assente nell'estremo sud. Predilige le esposizioni soleggiate in terreni freschi e profondi, ma non umidi, si adatta ai terreni argillosi e sale fino a 1.200 m di quota.

**UTILIZZO** - Il legno esternamente è roseo chiaro e semitenero, con durame scuro, ma tenace e di lunga durata; viene utilizzato per la fabbricazione di attrezzi agricoli ed è ottimo per la legna da ardere; nelle campagne era impiegato come tutore vivo per le viti e in questo caso era allevato a capitozza; la foglia veniva utilizzata come foraggio per ovini e caprini.