


Avocetta (*Recurvirostra avosetta*)



Ordine	Famiglia
Caradriformi	Recurvirostridi

CARATTERI DISTINTIVI - Di dimensioni medio grandi e corporatura slanciata, ha becco di colore nero, appiattito alla base, assottigliato all'apice e ricurvo in alto, zampe lunghe grigio-azzurrognole. I sessi sono simili. Il piumaggio è interamente bianco nelle parti inferiori, mentre in quelle superiori il colore bianco è contrastato da parti nere. Lunghezza cm 42-45, apertura alare cm 75-80, peso gr 230-430.

IDENTIFICAZIONE IN VOLO - È inconfondibile per il colore del piumaggio bianco niveo con marcature nere e il lungo becco curvato verso l'alto.

DISTRIBUZIONE - Specie diffusa dall'Europa occidentale e dal Nord Africa attraverso l'Asia centrale sino alla Siberia sud-orientale e alla Cina, in Africa centro-orientale e meridionale. Le popolazioni che nidificano nelle zone settentrionali sono migratrici, mentre quelle insediate in zone a clima mite compiono spostamenti dispersivi. I quartieri di svernamento delle popolazioni nidificanti nella Regione Palearctica occidentale si estendono dalle coste olandesi del Mare del Nord alle coste atlantiche europee, al bacino del Mediterraneo e a Sud sino alla costa atlantica dell'Africa occidentale, al Sahel e all'Arabia. La migrazione post-riproduttiva verso i quartieri di svernamento si svolge da luglio a ottobre, mentre quella pre-riproduttiva verso i quartieri di nidificazione ha luogo dalla metà di marzo a maggio.

In Italia è nidificante, parzialmente migratrice e svernante. La popolazione nidificante è caratterizzata da movimenti dispersivi verso la Penisola Iberica e il Marocco. I contingenti in transito e svernanti nel nostro Paese provengono dalle zone umide interne dell'Europa centrale e dalle coste nord-occidentali europee.

HABITAT - Frequenta lagune, stagni costieri e saline, nonché laghi e altri bacini d'acqua dolce nell'entroterra.

COMPORTEMENTO - Ha abitudini gregarie. Sul terreno e nelle acque basse cammina con andatura aggraziata e in riposo si sostiene su una sola zampa. Ha un volo diritto con ampie virate a rapidi battiti d'ala e scivolate nell'atterraggio. Raccoglie il cibo sia sul fango o nelle

acque basse spazzando col becco la superficie, sia nelle acque alte nuotando e immergendo anche la testa.

ALIMENTAZIONE - Si ciba di Insetti acquatici e loro larve, piccoli Molluschi, Crostacei e Anellidi.

RIPRODUZIONE - Nidifica in colonie su dossi e cumuli di sabbia nelle zone fangose. La preparazione del nido è preceduta da varie ed elaborate cerimonie nuziali, durante le quali la femmina si alza in volo emettendo una sorta di grido e, dopo aver eseguito dei voli a rapidi battiti d'ala, si posa sull'acqua col collo teso verticalmente. La scelta del sito ove costruire il nido è deciso dalla femmina, ma alla sua costruzione partecipa anche il maschio. Nell'anno compie una sola covata e la deposizione ha luogo tra aprile e giugno. In genere vengono deposte 4 uova, che sono incubate sia dalla femmina che dal maschio per 22-24 giorni. I pulcini abbandonano il nido subito dopo la schiusa e sono accuditi da entrambi i genitori. All'età di 35-40 giorni i giovani sono atti al volo.

STATUS E CONSERVAZIONE - La specie in Europa ha uno stato di conservazione favorevole.

LIVELLO DI PROTEZIONE - L'Avocetta è specie:

- nei confronti della quale sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat (Direttiva Uccelli 79/409/CEE, all. I);
- nei confronti della quale sono richiesti accordi internazionali per la sua conservazione e gestione (Convenzione di Bonn, all. II);
- rigorosamente protetta (Convenzione di Berna, all. II);
- particolarmente protetta in Italia (Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 2).