

## CORNILO SANGUINELLO

*Cornus sanguinea* L. – Fam. Cornaceae

Inglese: Dogwood – Tedesco: Blutroter Hartriegel



Foto di Saverio Bonani

**CARATTERI DISTINTIVI** - Arbusto deciduo di 1-4 metri, cespuglioso alla base con rami rossastri da adulto, longevo ma con crescita piuttosto lenta; i rami sono particolarmente vistosi in inverno; le foglie sono opposte rotondeggianti ellittiche acuminatae, a nervature convergenti verso l'apice e rossastre in autunno; i fiori sono bianchi con 4 petali riuniti in corimbo; la fioritura avviene in aprile-maggio; il frutto è una drupa di 6-7 mm di colore nero azzurrognola dal sapore amaro e non commestibile.

**AREALE E HABITAT** - Specie diffusa nell'Europa centrale, Asia minore e Caucaso. Moderatamente eliofila, ama i luoghi soleggiati anche sassosi, argillosi ma non acidi; è presente nelle macchie, radure e margini di boschi fino a 1.200 m di quota; si presta per il cespugliamento di pendici argillose.

**UTILIZZO** - Il legno è duro, compatto, tenace ed elastico, e veniva utilizzato per accessori di utensili campestri; la corteccia era usata come colorante color nocciola per tessuti; dai semi un tempo si ricavava un olio per lanterne, impiegato per i suoi pregi della combustione al posto dell'olio d'oliva.