

## Airone bianco maggiore (*Ardea alba*)



Ordine	Famiglia
<b>Ciconiformi</b>	<b>Ardeidi</b>

**CARATTERI DISTINTIVI** - Di dimensioni molto grandi e corporatura slanciata, ha collo e zampe lunghe, becco dritto, lungo e robusto di colore giallo in inverno e nero con base gialla in estate. I sessi sono simili. Il piumaggio è interamente bianco e durante il periodo riproduttivo il dorso si orna di lunghe penne filiformi. Lunghezza cm 55-100, apertura alare cm 140-170, peso gr 950-1.600.

**IDENTIFICAZIONE IN VOLO** - Le grandi dimensioni e il piumaggio interamente bianco ne consentono la facile identificazione.

**DISTRIBUZIONE** - Specie cosmopolita, che nidifica con diverse sottospecie in Europa sud-orientale, Asia centro-meridionale, Malesia, Australia, Nuova Zelanda, Africa, America centrale e meridionale. Nella Regione Palearctica occidentale estende l'areale di nidificazione dall'Europa centro-orientale ad Est fino alla Turchia, Ucraina e Russia meridionale; di recente si è insediato pure in alcune zone di Olanda, Francia e Italia settentrionale. Le popolazioni europee sono parzialmente migratrici e svernano nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo e in Medio Oriente.

In Italia è nidificante localizzato, migratore e svernante da ottobre sino a marzo-aprile. I contingenti svernanti nel nostro Paese provengono dai quartieri di nidificazione del centro Europa e dei Balcani.

**HABITAT** - Frequenta un'ampia varietà di zone umide, preferendo quelle assai estese e ricche di pesce: lagune, valli da pesca, saline; è pure presente nei greti dei fiumi, nelle risaie e nei campi coltivati.

**COMPORTEMENTO** - Ha abitudini più o meno gregarie e durante la notte si riunisce ad altri individui in dormitori comuni. È terragnolo e di rado si posa sugli alberi. Caccia camminando lentamente nelle acque poco profonde, compiendo un arresto e una repentina distensione del collo una volta individuata la preda; caccia pure all'aspetto restando immobile in posizione eretta oppure col collo tenuto quasi orizzontale e se le acque sono troppo profonde compie un rapido involo e un tuffo sulla preda.

**ALIMENTAZIONE** - Si ciba di Pesci, Anfibi, Invertebrati acquatici, piccoli Mammiferi.

**RIPRODUZIONE** - Nidifica in colonie, difficilmente associato con altre specie di Ardeidi. La formazione delle coppie è preceduta da esibizioni e parate nuziali da parte del maschio per attirare la femmina. Il nido viene costruito nelle zone palustri tra i fitti canneti e consiste in una piattaforma assai voluminosa di canne spezzate e reclinate. Nell'anno compie una sola covata e la deposizione ha luogo verso la fine di aprile. Le 3-5 uova deposte sono incubate da entrambi i partner per 25-26 giorni. I pulcini sono nidicoli e vengono nutriti dai genitori col cibo rigurgitato. La quantità di cibo procurata dai genitori non è sempre sufficiente per tutta la nidata e i più piccoli sono spesso destinati a morire di fame. All'età di circa 6 settimane i giovani si rendono indipendenti, ma rimangono nei pressi della colonia fino all'epoca della migrazione autunnale.

**STATUS E CONSERVAZIONE** - La specie in Europa ha uno stato di conservazione favorevole.

**LIVELLO DI PROTEZIONE** - L'Airone bianco maggiore è specie:

- nei confronti della quale sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat (Direttiva Uccelli 79/409/CEE, all. I);
- rigorosamente protetta (Convenzione di Berna, all. II);
- protetta in Italia (Legge 11 febbraio 1992, n. 157).