

Airone rosso (*Ardea purpurea*)



Ordine	Famiglia
Ciconiformi	Ardeidi

CARATTERI DISTINTIVI - Di dimensioni molto grandi e corporatura slanciata, ha collo e zampe lunghe, becco diritto, lungo e robusto di colore bruno-giallastro. I sessi sono simili. Il piumaggio delle parti superiori è grigio ardesia, quello delle parti inferiori è rosso-castano; il collo è di colore fulvo con striature nere. Lunghezza cm 78-90, apertura alare cm 120-150, peso gr 600-1.400.

IDENTIFICAZIONE IN VOLO - Visto da sotto, si evidenzia il bordo rossiccio sulla parte inferiore delle ali. Visto frontalmente il profilo delle ali è caratteristicamente arcuato. Dall'Airone cenerino si distingue per il collo tenuto più basso e più angolato.

DISTRIBUZIONE - Specie migratrice a lungo raggio, che nidifica nel Paleartico sud-occidentale e ad Est fino al Turkestan e all'Iran, in Africa orientale e meridionale. Tre diverse sottospecie sono diffuse rispettivamente nelle Isole di Capo Verde, in Madagascar e nell'Asia meridionale e orientale. Le popolazioni europee svernano principalmente nell'Africa subsahariana a Nord dell'Equatore e solo piccoli contingenti trascorrono l'inverno nei paesi del bacino del Mediterraneo, in Egitto e nella Penisola Arabica. La migrazione post-riproduttiva verso i quartieri di svernamento si svolge da agosto a ottobre, mentre quella pre-riproduttiva verso i quartieri di nidificazione ha luogo da metà marzo a maggio.

In Italia è migratore regolare, nidificante e svernante occasionale.

HABITAT - Frequenta le zone umide caratterizzate da acque stagnanti o a corso lento e ricche di vegetazione.

COMPORTEMENTO - Ha abitudini piuttosto solitarie ed elusive. Durante la migrazione, che compie principalmente nelle ore notturne, può riunirsi in piccoli gruppi anche con altre specie di Ardeidi. Trascorre gran parte della giornata in riposo nel folto dei canneti e si reca alla ricerca del cibo all'alba e al tramonto. Caccia abitualmente all'aspetto restando immobile col collo eretto nell'acqua poco profonda o su ciuffi di canne reclinate, oppure camminando lentamente. Le prede sono catturate con una rapida distensione del collo.

ALIMENTAZIONE - Si ciba di Pesci, Anfibi, lucertole, serpi, topi, arvicole, Insetti, Crostacei, Molluschi, ecc.

RIPRODUZIONE - Il nido viene realizzato nei folti canneti in genere su una piattaforma di canne spezzate e reclinate, oppure su alberi e cespugli intrecciando grossolanamente rami secchi e fuscilli. La femmina provvede alla costruzione del nido, mentre il maschio procura il materiale necessario. Nell'anno compie una sola covata e la deposizione ha luogo in aprile-maggio. Le 4-6 uova sono deposte ad intervalli di circa tre giorni l'uno dall'altro e sono incubate da entrambi i partner per 25-26 giorni. I pulcini sono nidicoli e vengono nutriti col cibo rigurgitato dai genitori. I giovani sono in grado di abbandonare il nido dopo 15 giorni dalla nascita e al sentore di un pericolo si arrampicano con destrezza tra le canne; sono in grado di volare all'età di 45-50 giorni e si rendono indipendenti a circa due mesi.

STATUS E CONSERVAZIONE - La specie in Europa ha uno stato di conservazione sfavorevole ed è ritenuta vulnerabile. Le principali minacce derivano sia dalla riduzione degli ambienti adatti alla riproduzione sia dalle improprie forme di gestione delle zone umide, come le pratiche annuali di sfalcio del canneto.

LIVELLO DI PROTEZIONE - L'Airone rosso è specie:

- nei confronti della quale sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat (Direttiva Uccelli 79/409/CEE, all. I);
- nei confronti della quale sono richiesti accordi internazionali per la sua conservazione e gestione (Convenzione di Bonn, all. II);
- rigorosamente protetta (Convenzione di Berna, all. II);
- protetta in Italia (Legge 11 febbraio 1992, n. 157).