

Gabbiano reale mediterraneo (*Larus cachinnans*)



Ordine Caradriformi	Famiglia Laridi
-------------------------------	---------------------------

CARATTERI DISTINTIVI - Di dimensioni grandi, ha becco robusto con apice della mandibola superiore curvato in basso. I sessi sono simili con dimorfismo stagionale. In inverno testa e collo posteriori sono bianchi con strie brune sparse, dorso e scapolari grigio-bluastre, groppone, sopraccoda, coda e restanti parti inferiori bianche; in estate testa, collo, gola e petto sono bianco puri. Il becco è giallo con apice biancastro e macchia rossa sulla mandibola inferiore, i tarsi e i piedi sono gialli. Lunghezza cm 55-65, apertura alare cm 140-155, peso gr 700-1.300.

IDENTIFICAZIONE IN VOLO - Facilmente riconoscibile per le parti superiori del dorso e delle ali grigie, la punta dell'ala nera con macchie terminali bianche e il becco giallo con la macchia rossa sulla mandibola.

DISTRIBUZIONE - Specie diffusa lungo le coste atlantiche della Francia e della Penisola Iberica, Isole Azzorre, Madeira, paesi del bacino del Mediterraneo e del Mar Nero. È caratterizzato sia da popolazioni sedentarie che migratrici o erratiche.

In Italia è nidificante sedentario, migratore regolare e svernante. Le colonie riproduttive più numerose sono insediate lungo le coste della Sardegna, nelle isole circumsiciliane e della Toscana, nelle zone umide costiere dell'alto Adriatico. Le popolazioni che nidificano nel nostro Paese manifestano un comportamento fortemente dispersivo, soprattutto da parte dei giovani.

HABITAT - Frequenta le coste e il mare aperto, le zone umide costiere, le aree portuali e le città costiere; di rado si inoltra nell'entroterra. Abituamente si porta nelle discariche di rifiuti urbani.

COMPORTEMENTO - Ha abitudini gregarie nel corso dell'intero anno e nidifica in colonie anche molto numerose. Possiede un volo possente, ma aggraziato, spesso veleggiato ad ali immobili. Sul terreno cammina abbastanza bene. Si posa spesso in acqua nuotando o semplicemente galleggiando, senza immergersi. Ricerca il cibo sia sulla superficie dell'acqua sia sul terreno.

Cattura in volo gli uccelli che attraversano il mare e quelli di maggiore mole vengono aggrediti a colpi d'ala e di becco fino a farli cadere.

ALIMENTAZIONE - Si ciba di Pesci e loro uova, Crostacei, Anellidi marini, Echinodermi, Molluschi, Insetti, Uccelli e loro uova, alghe, erbe, semi, frutta, carogne e sostanze di rifiuto.

RIPRODUZIONE - La stagione riproduttiva è compresa tra aprile e luglio e nell'anno compie una sola covata. Nell'area di nidificazione i maschi si affrontano allargando le ali e prendendosi per il becco si tirano a vicenda, oppure beccano il terreno e tirano con violenza l'erba. Anche quando la coppia è già formata si possono verificare atteggiamenti di ostilità nei confronti delle coppie dei nidi vicini. Il nido è costruito in una buca del terreno con erba, steli, alghe ed altro materiale vegetale. In genere vengono deposte 3 uova e l'incubazione ha inizio con la deposizione del primo uovo, per cui la schiusa è asincrona e i pulcini della nidiata mostrano un diverso grado di sviluppo. La cova si protrae per 28-30 giorni ed è effettuata sia dalla femmina che dal maschio. Nel primo periodo di vita i pulcini vengono alimentati soprattutto dal maschio. I giovani abbandonano il nido poco dopo la nascita ma si mantengono nelle sue vicinanze fintanto che non sono atti al volo, ciò che avviene all'età di circa 6 settimane.

STATUS E CONSERVAZIONE - La specie in Europa ha uno stato di conservazione favorevole.

LIVELLO DI PROTEZIONE - Il Gabbiano reale mediterraneo è specie:

- protetta e il cui sfruttamento non dovrà comprometterne la sopravvivenza (Convenzione di Berna, all. III);
- protetta in Italia (Legge 11 febbraio 1992, n. 157).