


## Muggine musino (*Liza saliens*)



|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Ordine             | Famiglia        |
| <b>Mugiliformi</b> | <b>Mugilidi</b> |

**CARATTERI DISTINTIVI** - Pesce di taglia media che può raggiungere la lunghezza di 40 cm e il peso di 2,5 Kg. Il corpo, ricoperto da grosse scaglie, ha forma cilindrica ed è compresso nella parte caudale; la testa è massiccia appiattita dorsalmente e il muso è leggermente appuntito. La bocca piuttosto grande è munita di denti piccoli. Simile al Cefalo comune anche nella colorazione, si distingue per le minori dimensioni.

**DISTRIBUZIONE** - È diffuso lungo le coste dell'Oceano Atlantico dal Golfo di Guascogna al Marocco, nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero.

In Italia è presente nelle acque marine costiere, negli estuari e nelle lagune.

**HABITAT** - Assai adattabile per quanto riguarda le variazioni della salinità e della temperatura delle acque, frequenta l'ambiente marino costiero e le acque interne costiere con fondali ricchi di vegetazione.

**BIOLOGIA** - Conduce vita gregaria in piccoli gruppi. È onnivoro e si ciba di particelle organiche e inorganiche, microalghe, plancton, piccoli Crostacei, Molluschi e larve di Insetti. Si riproduce in mare e si accresce nelle acque interne costiere, soprattutto lagune ed estuari. Gli avannotti, dopo una breve fase di sviluppo in mare, raggiungono le acque interne costiere, dove trovano elevata disponibilità alimentare e quindi condizioni ottimali per il loro sviluppo. Raggiunta la maturità sessuale (al secondo anno nei maschi e al terzo anno nelle femmine) i riproduttori migrano nelle acque marine costiere. Ogni femmina è seguita a breve distanza da diversi maschi, che al momento della emissione delle uova si affiancano alla femmina e operano la fecondazione.

**STATUS E CONSERVAZIONE** - È una delle specie più comuni e le popolazioni sono numericamente consistenti.