


Nono (*Aphanius fasciatus*)



a) maschio b) femmina

Ordine	Famiglia
Ciprinodontiformi	Ciprinodontidi

CARATTERI DISTINTIVI - Pesce di taglia molto piccola, la cui lunghezza massima è di circa 7-8 cm e il peso di g 10. Ha corpo tozzo e compresso, bocca piccola con mandibola prominente. Evidente è il dimorfismo sessuale: il maschio, che ha minori dimensioni, presenta una colorazione argenteo-verdastra molto brillante con striature trasversali scure sui fianchi e pinne gialle; la femmina ha una colorazione uniforme grigio-verdastra con pinne incolori e striscie scure sui fianchi meno evidenti.

DISTRIBUZIONE - È diffuso lungo le coste del Mar Mediterraneo.

In Italia è presente nelle regioni costiere dell'alto Adriatico e dell'alto e medio Tirreno, di Puglia, Sicilia e Sardegna.

HABITAT - Frequenta in prevalenza le acque interne costiere salmastre e quelle salate con livelli di salinità anche superiori a quelli del mare, come ad esempio i bacini di prima evaporazione delle saline.

BIOLOGIA - Conduce vita gregaria in branchi molto numerosi. Si nutre di piccoli Invertebrati planctonici e bentonici, larve di Insetti e alghe. Il periodo riproduttivo è compreso tra marzo e giugno. La femmina depone sul fondo e tra la vegetazione fino a 200 uova, che aderiscono al substrato coi filamenti adesivi di cui sono provviste. Lo sviluppo embrionale si completa in 10-14 giorni. La maturità sessuale viene in genere raggiunta all'età di un anno in entrambi i sessi.

STATUS E CONSERVAZIONE - In alcune aree è presente con popolazioni numericamente consistenti, in altre, a causa delle alterazioni dell'habitat e dell'inquinamento, è in sensibile decremento.

LIVELLO DI PROTEZIONE - Il Nono è specie:

- rigorosamente protetta (Convenzione di Berna, all. II);
- specie d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione (Direttiva 92/43/CEE, All. II).