

Pettegola (*Tringa totanus*)



Ordine	Famiglia
Caradriformi	Scolopacidi

CARATTERI DISTINTIVI - Di dimensioni medio piccole, ha forme eleganti con becco di media lunghezza di colore rosso con apice nero, coda quadrata e zampe lunghe di color arancione. Il piumaggio in entrambi i sessi è brunastro fittamente striato di nero e grigio nelle parti superiori, biancastro striato di scuro nelle parti inferiori; il dorso e il groppone sono bianchi, le ali presentano un largo margine posteriore bianco, la coda è barrata di bianco e nero. Lunghezza cm 27-28, apertura alare cm 60-65, peso gr 100-140.

IDENTIFICAZIONE IN VOLO - Si caratterizza per il bordo posteriore dell'ala bianco e per il dorso e il groppone pure bianchi. Può essere facilmente confusa col Totano moro e con la Pantana.

DISTRIBUZIONE - Specie in gran parte migratrice, che nidifica con diverse sottospecie nelle zone temperate e boreali della Regione Palearctica dall'Islanda fino alla Cina orientale. Le popolazioni della Regione Palearctica occidentale svernano nell'Europa nord-occidentale, nelle zone costiere dell'Atlantico dal Mare del Nord all'Africa occidentale, e nel bacino del Mediterraneo. La migrazione post-riproduttiva verso i quartieri di svernamento inizia nella seconda metà di giugno e prosegue fino a settembre, mentre quella pre-riproduttiva verso i quartieri di nidificazione ha luogo tra la seconda metà di marzo e maggio.

In Italia è migratrice regolare, svernante in poche zone umide costiere dell'Adriatico e della Sardegna, nidificante parzialmente sedentaria in massima parte nella Laguna di Venezia.

HABITAT - Nelle zone di riproduzione frequenta le brughiere costiere o dell'entroterra, le praterie umide, vaste paludi e, in Italia, i dossi costieri delle valli salmastre; durante la migrazione e nelle aree di svernamento predilige spiagge marine, lagune, estuari, saline, stagni costieri, marcite, rive di laghi.

COMPORTEMENTO - Di indole molto attiva, conduce vita gregaria in piccole brigate, ma durante la migrazione o nelle aree di svernamento forma branchi molto numerosi anche associata a pittime e piovanelli. Possiede un volo rapido e piuttosto ondulato con frequenti

battute d'ala e qualche scivolata. Sul terreno cammina con passo veloce o di corsa. Ricerca il cibo sia sul terreno asciutto o fangoso sia nell'acqua bassa, immergendosi anche parzialmente. È una buona nuotatrice.

ALIMENTAZIONE - Si ciba di Insetti e loro larve, Molluschi, Crostacei, Anellidi, Aracnidi, Anfibi e avannotti.

RIPRODUZIONE - La formazione delle coppie è preceduta da una caratteristica parata nuziale del maschio, che sorvola l'area di nidificazione e poi plana non molto lontano da una femmina con le ali arcuate e la coda aperta a ventaglio; quindi compie un successivo volo emettendo un caratteristico richiamo e cala nuovamente a terra nei pressi della femmina, alla quale cammina attorno con le ali pendenti e scuotendo la testa ad intervalli. Nidifica in colonie non numerose da aprile a giugno e nell'anno compie una sola covata. In una depressione del terreno tra la vegetazione erbacea vengono deposte in genere 4 uova, che sono incubate per 23-24 giorni sia dalla femmina che dal maschio. I pulcini sono accuditi da entrambi i genitori per circa un mese.

STATUS E CONSERVAZIONE - La specie in Europa ha uno stato di conservazione sfavorevole ed è ritenuta in declino. Negli ultimi decenni hanno inciso negativamente sulla popolazione nidificante nei paesi nord-occidentali soprattutto la trasformazione degli habitat idonei e le pratiche agricole che caratterizzano l'agricoltura moderna.

LIVELLO DI PROTEZIONE - La Pettegola è specie:

- nei confronti della quale sono richiesti accordi internazionali per la sua conservazione e gestione (Convenzione di Bonn, all. II);
- protetta e il cui sfruttamento non dovrà comprometterne la sopravvivenza (Convenzione di Berna, all. III);
- cacciabile solo in alcuni Stati membri dell'Unione Europea (Direttiva Uccelli 79/409/CEE, all. II/2);
- protetta in Italia (Legge 11 febbraio 1992, n. 157).