

Svasso maggiore (*Podiceps cristatus*)



a) livrea estiva b) livrea invernale

Ordine	Famiglia
Podicipediformi	Podicipedidi

CARATTERI DISTINTIVI - Di dimensioni medio grandi, ha il becco diritto, compresso e appuntito di colore rosa carnicino più chiaro all'apice e nero sul culmine, il collo lungo e sottile, i tarsi molto corti di colore verde-olivastro e giallastro. I sessi sono praticamente simili, per quanto la femmina sia di minori dimensioni e con ciuffi auricolari meno sviluppati. La testa presenta il vertice nero, una stria bianca sopra gli occhi, le redini, il mento e la parte anteriore della faccia bianchi, le guance bruno-rossicce. Le parti inferiori sono bianche tendenti al sericeo, mentre i fianchi sono bruno-rossicci. Lunghezza cm 46-50, apertura alare cm 85-90, peso 600-1.200.

IDENTIFICAZIONE IN VOLO - Si caratterizza per il volo teso con veloci battiti d'ala, il collo molto sottile tenuto leggermente flesso, le zampe che fuoriescono dalla coda e due ampi specchi bianchi sulle ali. Le maggiori dimensioni consentono di distinguerlo dagli altri svassi.

DISTRIBUZIONE - Specie diffusa in Europa, Asia centrale e occidentale, Africa, Australia e Nuova Zelanda. Le aree di svernamento delle popolazioni migratrici europee sono comprese tra il 35° e il 55° parallelo nell'Europa nord-occidentale, nel Mar Nero e nel Mediterraneo. La migrazione post-riproduttiva verso i quartieri di svernamento si svolge tra la fine di luglio e la metà di dicembre, mentre quella pre-riproduttiva verso i quartieri di nidificazione ha luogo da metà febbraio all'inizio di maggio.

In Italia è nidificante estivo e residente, migratore e svernante.

HABITAT - Nelle aree di riproduzione frequenta le zone umide d'acqua dolce con vegetazione palustre emergente ed aree aperte abbastanza estese, mentre durante la migrazione e nelle aree di svernamento sosta in zone umide di vario tipo: laghi più o meno estesi, fiumi e canali a corso lento, lagune, acque marine costiere.

COMPORTEMENTO - Dimostra una buona socialità anche durante il periodo riproduttivo. Trascorre nell'acqua la maggior parte della vita e si porta sul terreno solo in casi di assoluta

necessità. È molto abile nell'immersione e nel nuoto, che compie con il corpo semisommerso e il collo eretto. Per alzarsi in volo deve aiutarsi nel decollo anche con le zampe, effettuando una lunga rincorsa sulla superficie dell'acqua. Ha un volo rapido, rettilineo e normalmente a bassa quota. È piuttosto riluttante a prendere il volo e quando si sente disturbato preferisce allontanarsi a nuoto o immergersi sott'acqua anche per oltre mezzo minuto.

ALIMENTAZIONE - Si ciba di Insetti e loro larve, Crostacei, Molluschi, piccoli Pesci, Anfibi, piante acquatiche.

RIPRODUZIONE - Tra la fine di febbraio e marzo, il periodo della riproduzione è annunciato da complessi cerimoniali nuziali eseguiti per lo più di notte e quasi sempre al chiaro di luna: i due partner si dispongono in acqua l'uno contro il petto dell'altro e si offrono reciprocamente del materiale vegetale, alzando e abbassando i caratteristici ciuffi di penne del capo; effettuano poi tipiche evoluzioni sollevandosi in piedi sull'acqua e percorrendo in tale posizione qualche metro prima di tuffarsi. Tra la vegetazione palustre viene costruito il nido galleggiante da entrambi i sessi, utilizzando steli e foglie. Gli accoppiamenti avvengono sul nido. Nell'anno compie una o due covate e le 3-5 uova deposte sono incubate sia dalla femmina che dal maschio per 27-29 giorni dopo la deposizione del primo uovo, cosicché la schiusa è asincrona. I pulcini sono precoci e semi-nidifughi e vengono accuditi da entrambi i genitori. I giovani sono in grado di volare ad un'età superiore alle 10 settimane..

STATUS E CONSERVAZIONE - La specie in Europa ha uno stato di conservazione favorevole.

LIVELLO DI PROTEZIONE - Lo Svasso maggiore è specie:

- protetta e il cui sfruttamento non dovrà comprometterne la sopravvivenza (Convenzione di Berna, all. III);
- protetta in Italia (Legge 11 febbraio 1992, n. 157).