

## Tordo sassello (*Turdus iliacus*)



Ordine	Famiglia
Passeriformi	Turdidi

**CARATTERI DISTINTIVI** - Di dimensioni medio piccole, ha becco robusto, coda di media lunghezza e quadrata, tarsi lunghi e forti. In entrambi i sessi il piumaggio è di colore bruno-olivastro scuro nelle parti superiori, bianco-fulvo striato di scuro nelle parti inferiori, coda marrone scuro. Lunghezza cm 21-22, apertura alare cm 33-34, peso gr 50-80.

**IDENTIFICAZIONE IN VOLO** - Visto da sotto, è riconoscibile la colorazione castana sotto le ali e la striatura del petto e dei fianchi. Per le dimensioni e le forme pressoché identiche può essere confuso col Tordo bottaccio.

**DISTRIBUZIONE** - Specie migratrice a lungo raggio o migratrice parziale, diffusa come nidificante alle alte e medie latitudini dell'Europa settentrionale e dell'Asia nord-occidentale, soprattutto nelle regioni sub-artiche e artiche. I quartieri di svernamento delle popolazioni migratrici europee interessano l'Europa occidentale e i paesi del bacino del Mediterraneo fino al Maghreb. La migrazione post-riproduttiva verso i quartieri di svernamento si svolge tra fine settembre e novembre, quella pre-riproduttiva verso i quartieri di nidificazione inizia a metà febbraio e si conclude a fine aprile.

In Italia è specie migratrice regolare, svernante e nidificante irregolare. I contingenti che transitano e svernano nel nostro Paese originano per lo più dalla Penisola Scandinava e dalla Russia.

**HABITAT** - Frequenta boschi, parchi e, al di fuori del periodo della riproduzione, pascoli, zone coltivate, terreni in prossimità di zone umide.

**COMPORTEMENTO** - Conduce vita gregaria, spesso anche con la Cesena, eccetto che nel periodo della riproduzione. Possiede un volo veloce e abbastanza diritto. Ricerca il cibo sul terreno nei campi e nel sottobosco, dove corre e saltella agilmente. Arboricolo, riposa sugli alberi e sui cespugli nascosto tra il fogliame. Fa udire un canto flautato piuttosto monotono, che può essere confuso, soprattutto all'epoca della riproduzione, con quello del Tordo bottaccio.

**ALIMENTAZIONE** - Si ciba principalmente di Insetti e loro larve, Molluschi, bacche e frutti selvatici.

**RIPRODUZIONE** - La stagione riproduttiva è compresa tra metà maggio e luglio. Nidifica nelle aree boschive e cespugliate, prediligendo foreste di betulle e ontani. Il nido viene costruito sia sugli alberi o nei cespugli, utilizzando materiale vegetale impastato con fango, sia sul terreno ai piedi di un albero o tra le radici di una pianta abbattuta. La femmina, due volte all'anno, depone 5-6 uova, che vengono incubate anche dal maschio per circa 13 giorni. I pulcini sono inetti e nidicoli e vengono alimentati da entrambi i genitori per circa due settimane.

**STATUS E CONSERVAZIONE** - La specie in Europa ha uno stato di conservazione favorevole.

**LIVELLO DI PROTEZIONE** - Il Tordo sassello è specie:

- protetta e il cui sfruttamento non dovrà comprometterne la sopravvivenza (Convenzione di Berna, all. III);
- cacciabile solo in alcuni Stati membri dell'Unione Europea (Direttiva Uccelli 79/409/CEE, all. II/2);
- oggetto di caccia in Italia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio (Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18).